



FICHA TÉCNICA



DESARROLLO TÉCNICO

Octubre, 2019

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

TIPO DE AGROINSUMO: Herbicida Agrícola

NOMBRE COMERCIAL: SATELITE® 456 CS

FORMULACION: Suspensión encapsulada

pH DE LA FORMULACIÓN:
ND

COLOR:
Amarillo

SOLUBILIDAD EN AGUA:
Misible

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: % EN PESO
Ingredientes activos
Pendimetalin: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina -38.96
(Equivalente a 456 g de i.a./ L a 20°C)

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:

Pendimetalin

FAMILIA QUIMICA:

Dinitroanilina.

FORMULA QUIMICA:

C₁₃H₁₉N₃O₄

Ingredientes inertes

Solventes 61.04

Total..... 100.00

MODO DE ACCION: SATELITE® 456 CS es un herbicida selectivo, formulado como suspensión encapsulada de aplicación estrictamente pre-emergente a la maleza ya que actúa sobre la semilla de malezas anchas y angostas afectando la germinación, no tiene efecto en maleza emergida. Su control es sobre malezas anuales que se reproducen por semilla. En el caso de malezas perenes solo evitará la germinación de las semillas, pero no tiene efecto sobre estructuras de reproducción asexual (rizomas, tubérculos, estolones)

Para su aplicación la preparación del suelo es un punto crítico ya que la presencia de terrones o residuos vegetales limita su buen desempeño. Además, el suelo debe tener humedad para su correcto funcionamiento.

CATEGORÍA DE PELIGRO:

5 Precaución

RESIDUALIDAD:

Moderada

NÚMERO DE REGISTRO:

RSCO-HEDE-0246-X0201-408-38.96

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Malezas	NOMBRE CIENTÍFICO	Dosis Litros/ha	Recomendaciones
Maíz (SL) Sorgo (SL) Cebada (SL) Trigo (SL)	Fresadilla Zacate Cadillo Quelite Verdolaga	<i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Chenchrus echinatus</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	2.5-3.5	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza dirigida al suelo. Calibre su equipo de aplicación.
Arroz (SL)	Coquillo Zacate de agua Verdolaga Quelite cenizo	<i>Cyperus esculentus</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Chenopodium album</i>	3.0-3.5	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza dirigida al suelo. Calibre su equipo de aplicación.
Cebolla (SL) Cebollín (SL) Poro (SL) Esparrago (SL) Ajo (SL)	Quelite Verdolaga Quintonil Zacate grama	<i>Chenopodium album</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Cynodon dactylon</i>	3.0-3.5	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza dirigida al suelo. Calibre su equipo de aplicación.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.

SL=Sin Límite.

Tiempo de reentrada: 48 horas después de la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS:

Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Presentaciones:
1 L
5 L

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:

UPL AGRO, S.A. DE C.V. Av. Gabriel Mancera No. 1815 - 402 Col. del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, Ciudad de México Tels.: (55) 4196 7031 al 37